

大項目	中項目	小項目	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	
症例数/死亡率	全疾患	全入院症例死亡率	4.74%	5.06%	4.61%	4.51%	4.07%	3.78%	3.48%	3.71%	3.34%	
		全手術実施症例死亡率	1.42%	1.71%	1.61%	1.41%	1.00%	1.02%	1.10%	1.44%	1.48%	
		救急搬送症例死亡率	10.16%	11.53%	10.40%	10.75%	9.98%	9.23%	7.92%	8.16%	7.18%	
	手術/疾患	CABG実施症例死亡率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PTCA実施症例死亡率	-	0.00%	1.66%	1.27%	1.42%	1.42%	0.46%	0.55%	0.66%	
		CEA実施症例死亡率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		食道悪性腫瘍手術実施症例死亡率	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	
膵臓悪性腫瘍手術実施症例死亡率	-	0.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	-	-			
狭心症・急性心筋梗塞(AMI)症例CAG,PTCA,CABG実施割合	61.99%	64.80%	92.70%	93.53%	96.67%	94.61%	96.30%	95.61%	96.50%			
診療プロセス	AMI	アスピリン使用率	61.22%	67.35%	60.35%	71.88%	81.82%	74.63%	76.92%	79.59%	82.54%	
		β ブロッカー使用率	2.04%	3.98%	16.88%	4.86%	7.58%	22.39%	28.85%	36.73%	25.40%	
	市中肺炎	初回抗生剤投与開始日	投与割合	96.78%	97.01%	98.63%	94.23%	96.89%	97.18%	98.77%	98.81%	96.51%
		開始日平均	1.28日	1.16日	1.06日	1.14日	1.15日	1.10日	1.15日	1.14日	1.11日	
	初回抗生剤組合せ	ロセフィン	34.58%	17.15%	20.70%	21.08%	19.27%	17.39%	7.45%	15.66%	10.84%	
		ユナシンS	34.11%	57.20%	49.55%	38.50%	41.28%	47.34%	55.28%	56.02%	50.60%	
	敗血症	血液培養検査実施率	73.78%	81.09%	73.08%	67.60%	65.98%	76.11%	90.38%	90.38%	100.00%	
DIC	凝固系検査実施率	95.12%	97.92%	98.81%	91.67%	97.50%	90.77%	86.96%	90.00%	93.75%		
指導	肺血栓塞栓症予防管理料	78.81%	79.74%	81.07%	79.34%	79.23%	85.77%	83.99%	85.40%	86.32%		
感染症	院内感染	1) 中心静脈注射→敗血症	5.45%	5.45%	4.55%	8.41%	9.77%	7.11%	5.83%	5.91%	2.93%	
		2) 人工呼吸→肺炎	6.86%	4.11%	4.38%	6.07%	4.26%	4.90%	5.38%	14.39%	5.56%	
		3) 膀胱留置カテーテル→尿路感染	1.28%	0.83%	0.86%	1.73%	0.90%	1.02%	2.54%	3.03%	2.80%	
	手術創感染	1) 股関節形成術実施症例	10.00%	4.17%	0.00%	0.00%	8.70%	0.00%	9.09%	0.00%	0.00%	
		2) 膝関節形成術実施症例	24.56%	18.62%	7.55%	7.19%	12.30%	7.38%	5.50%	2.90%	2.50%	
3) 腹式子宮摘出術実施症例	12.50%	5.56%	0.00%	0.00%	-	-	100.00%	-	-			
合併症	合併症による死亡率	0.20%	0.05%	0.17%	0.34%	0.15%	0.18%	0.10%	0.24%	0.20%		
	合併症による急性心停止率	0.35%	0.00%	0.38%	0.20%	0.19%	0.21%	0.10%	0.12%	0.05%		
再入院	再入院率 3402	1) 全症例	再入院30	3.12%	3.22%	5.14%	5.21%	2.72%	3.05%	3.38%	3.48%	3.67%
			再入院42	5.02%	4.65%	7.31%	7.75%	4.39%	4.98%	3.78%	4.01%	3.89%
		2) 慢性閉塞性肺疾患症例	再入院30	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.32%	0.00%	0.00%	13.04%
			再入院42	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.03%	20.75%	0.00%	2.78%	13.04%
		3) 肺炎(15歳以上)	再入院30	1.49%	3.25%	0.64%	0.65%	0.77%	1.50%	1.41%	0.00%	1.40%
			再入院42	3.35%	4.42%	1.51%	2.51%	2.30%	2.25%	1.41%	0.40%	1.40%
		4) 心不全	再入院30	4.69%	2.65%	4.22%	4.65%	9.60%	6.14%	7.58%	6.03%	2.07%
			再入院42	10.94%	5.19%	6.27%	8.64%	12.63%	9.21%	7.07%	5.60%	3.11%
		5) 狭心症	再入院30	2.14%	5.83%	16.74%	12.12%	3.67%	1.91%	2.37%	2.39%	1.31%
			再入院42	2.50%	7.64%	23.17%	20.03%	5.83%	3.18%	2.17%	2.93%	1.96%
		6) 急性心筋梗塞(AMI)	再入院30	1.96%	0.00%	1.04%	3.27%	0.00%	2.44%	0.00%	1.61%	0.00%
			再入院42	1.96%	0.00%	1.04%	3.27%	0.00%	2.44%	0.00%	1.61%	0.00%
全手術	手術実施率	40.33%	43.12%	43.58%	43.17%	45.47%	47.06%	47.96%	45.75%	42.94%		
	予定・緊急手術割合	72.95%	72.56%	75.47%	78.63%	77.22%	76.71%	76.45%	71.23%	70.56%		
初回手術	手術在院日数	在院日数	14.05日	15.14日	15.31日	14.79日	13.78日	15.40日	15.93日	15.81日	15.89日	
		術前	2.39日	2.66日	2.77日	2.55日	5.47日	2.08日	2.20日	2.35日	2.30日	
	周術期抗生剤管理	セファメジン	57.25%	63.86%	66.09%	69.19%	56.58%	60.72%	62.15%	56.89%	50.62%	
		ホスミシンS	7.58%	4.99%	5.06%	4.14%	11.56%	13.96%	10.66%	12.53%	15.04%	
	術後創傷ケア実施率・実施日数	実施率	57.20%	56.77%	51.55%	50.84%	12.02%	1.41%	0.99%	0.90%	3.44%	
		実施日数	7.18日	8.05日	8.36日	8.38日	5.20日	1.55日	1.31日	1.70日	3.36日	
	術後ドレーン実施率・実施日数	実施率	21.16%	21.41%	22.40%	22.82%	19.75%	17.97%	15.54%	9.47%	14.17%	
		実施日数	3.65日	3.86日	3.47日	3.68日	2.84日	2.94日	1.78日	3.12日	5.53日	
	術後膀胱留置カテーテル実施率	38.34%	40.45%	39.04%	37.34%	37.67%	39.61%	39.27%	34.70%	35.45%		
	術後中心静脈注射実施率・実施日数	実施率	2.60%	2.38%	2.12%	2.24%	2.11%	1.87%	2.16%	1.48%	3.34%	
		実施日数	13.09日	12.59日	14.36日	16.24日	14.67日	12.79日	19.79日	8.47日	11.63日	
	術後リハビリ実施率・実施日数	実施率	31.39%	34.97%	36.08%	36.76%	35.95%	39.64%	42.59%	41.17%	41.79%	
		実施日数	2.64日	2.41日	2.21日	1.81日	1.83日	1.91日	1.93日	2.12日	2.22日	
	術日病理検査実施率	36.39%	33.10%	27.59%	23.64%	25.46%	25.33%	27.73%	29.12%	25.33%		
	術後生化学検査実施率・実施日数	実施率	64.05%	68.37%	71.28%	70.99%	73.39%	74.24%	78.74%	77.86%	77.00%	
		実施日数	5.68日	5.61日	5.98日	5.50日	3.66日	4.11日	5.67日	6.49日	7.37日	
	術後CRP検査実施率・実施日数	実施率	57.15%	60.60%	66.80%	67.39%	70.25%	70.68%	74.32%	72.90%	70.85%	
		実施日数	4.49日	4.23日	4.53日	4.06日	3.58日	4.01日	4.08日	4.36日	4.76日	
	術後末血一般検査実施率・実施日数	実施率	66.06%	71.36%	73.49%	73.27%	73.97%	73.96%	77.58%	76.34%	75.38%	
		実施日数	4.46日	4.21日	4.61日	4.09日	3.78日	4.17日	4.26日	4.45日	4.75日	
	術後尿・糞便検査実施率・実施日数	実施率	12.59%	11.59%	10.96%	11.60%	8.31%	11.17%	11.71%	12.90%	15.27%	
		実施日数	2.67日	1.90日	2.23日	2.37日	1.93日	1.83日	2.00日	1.88日	1.97日	
	術後単純X-P実施率・実施回数	実施率	60.48%	63.00%	60.12%	61.06%	62.06%	63.11%	65.42%	63.39%	65.41%	
		実施回数	4.49回	4.22回	4.82回	4.43回	3.83回	4.09回	4.05回	4.15回	4.29回	
	術後単純CT/MRI実施率・実施回数	実施率	16.21%	18.86%	18.54%	18.63%	18.61%	22.06%	22.46%	22.69%	28.67%	
		実施回数	2.34回	2.59回	3.22回	2.39回	1.60回	1.78回	1.99回	2.23回	2.39回	
	術後核医学実施率・実施回数	実施率	0.15%	0.14%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.00%	0.04%	0.00%	
実施回数		3.00回	0.25回	0.17回	0.08回	1.00回	1.00回	0.00回	1.00回	0.00回		
悪性腫瘍	レジメン	症例数	208.00例	16例	18例	14例	15例	300例	19例	20例	155例	
高額薬剤	脳梗塞	アルブミン使用率・使用日数	使用率	1.05%	1.05%	1.21%	1.08%	0.73%	0.71%	1.21%	0.86%	0.45%
			使用日数	2.68日	2.37日	2.45日	2.70日	2.00日	2.51日	3.91日	2.79日	3.00日
		グロブミン使用率・使用日数	使用率	1.09%	1.05%	0.89%	0.71%	0.35%	0.75%	0.97%	0.55%	0.61%
			使用日数	2.85日	3.00日	3.14日	2.85日	3.10日	3.73日	3.20日	3.68日	3.53日
		アンチトロンビンⅢ使用率	0.08%	0.04%	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
		MRSA用薬剤使用率・使用日数	使用率	2.55%	1.47%	1.12%	1.33%	0.71%	1.08%	1.26%	1.12%	1.33%
	使用日数		9.48日	10.83日	8.86日	9.36日	7.07日	7.46日	9.30日	7.40日	9.20日	
	オザクレルナトリウム使用率・使用日数	使用率	9.23%	41.49%	15.47%	9.83%	5.13%	13.91%	4.38%	6.59%	4.12%	
		使用日数	8.83日	6.77日	4.00日	3.04日	4.00日	5.06日	5.00日	7.09日	3.43日	
	エダラポン使用率・使用日数	使用率	46.15%	62.53%	71.08%	59.28%	58.97%	47.83%	48.91%	50.30%	51.76%	
		使用日数	7.87日	6.92日	4.22日	4.25日	3.90日	4.31日	5.87日	5.69日	5.28日	
	心不全	ハンプ使用率・使用日数	使用率	91.01%	79.51%	72.70%	79.47%	80.75%	84.78%	85.98%	84.52%	68.42%
使用日数			6.96日	5.16日	5.96日	7.09日	7.05日	5.78日	4.83日	4.42日	3.69日	