

がん腫	登録No.	レジメン名	薬品名	1日投与量	単位	投与時間	投与日	投与サイクル	コメント
大腸がん	24	m-FOLFOX6	レボホリナート オキサリプラチン 5 FU 5 FU	200 85 400 2400	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	2時間 2時間 10分 46時間 (インフューザ・ポンプ)	day1 day1 day1 day1	14日	術後補助は8コース 進行再発はPDまで
大腸がん	166	BEV+m-FOLFOX6	アバスタチン レボホリナート オキサリプラチン 5 FU 5 FU	5 200 85 400 2400	mg/kg mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	90分→60分→30分 2時間 2時間 10分 46時間 (インフューザ・ポンプ)	day1 day1 day1 day1 day1	14日	PDまで
大腸がん	23	FOLFIRI	レボホリナート カンプト 5 FU 5 FU	200 150 400 2400	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	2時間 90分 10分 46時間 (インフューザ・ポンプ)	day1 day1 day1 day1	14日	PDまで
大腸がん	6	BEV+FOLFIRI	アバスタチン レボホリナート カンプト 5 FU 5 FU	5 200 150 400 2400	mg/kg mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	90分→60分→30分 2時間 90分 10分 46時間 (インフューザ・ポンプ)	day1 day1 day1 day1 day1	14日	PDまで
大腸がん	181	RAM+FOLFIRI	サイラムザ レボホリナート カンプト 5 FU 5 FU	8 200 150 400 2400	mg/kg mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	60分 2時間 90分 10分 46時間 (インフューザ・ポンプ)	day1 day1 day1 day1 day1	14日	PDまで
大腸がん	214	AFL+FOLFIRI	ザルトラップ レボホリナート カンプト 5 FU 5 FU	4 200 150 400 2400	mg/kg mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	60分 2時間 90分 10分 46時間 (インフューザ・ポンプ)	day1 day1 day1 day1 day1	14日	PDまで
大腸がん	67	XELOX	オキサリプラチン カベシタピン	130 2000	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	2時間 1日2回朝夕食後内服	day1 day1夕食後～day15朝食後	21日	術後補助は6コース 進行再発はPDまで
大腸がん	68	BEV+XELOX	アバスタチン オキサリプラチン カベシタピン	7.5 130 2000	mg/kg mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	90分→60分→30分 2時間 1日2回朝夕食後内服	day1 day1 day1夕食後～day15朝食後	21日	PDまで
大腸がん	83	SOX	オキサリプラチン エスワン	130 80～120	mg/m <sup>2</sup> mg/body	2時間 1日2回朝夕食後内服	day1 day1夕食後～day15朝食後	21日	術後補助は6コース 進行再発はPDまで

大腸がん	104	BEV+SOX	アバスタチン オキサリプラチン エスワン	7.5 130 80~120	mg/kg mg/m <sup>2</sup> mg/body	90分→60分→30分 2時間 1日2回朝夕食後内服	day1 day1 day1夕食後～day15朝食後	21日	PDまで
大腸がん	88	IRIS	カンプト エスワン	150 80~120	mg/m <sup>2</sup> mg/body	90分 1日2回朝夕食後内服	day1 day1夕食後～day15朝食後	21日	PDまで
大腸がん	91	BEV+IRIS	アバスタチン カンプト エスワン	7.5 150 80~120	mg/kg mg/m <sup>2</sup> mg/body	90分→60分→30分 90分 1日2回朝夕食後内服	day1 day1 day1夕食後～day15朝食後	21日	PDまで
大腸がん	199	XELIRI	カンプト カベシタピン	150 1600	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	90分 1日2回朝夕食後内服	day1 day1夕食後～day15朝食後	21日	PDまで
大腸がん	200	BEV+XELIRI	アバスタチン カンプト カベシタピン	7.5 150 1600	mg/kg mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	90分→60分→30分 90分 1日2回朝夕食後内服	day1 day1 day1夕食後～day15朝食後	21日	PDまで
大腸がん	162	RPMI	レボホリナート 5 FU	200 400	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	2時間 10分(レボホリナート開始後1時間)	day1・8・15・22・29・36 day1・8・15・22・29・36	56日(8週)	PDまで
大腸がん	31	BEV+I-LV/ 5 FU	アバスタチン レボホリナート 5 FU	5 200 400	mg/kg mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	90分→60分→30分 2時間 10分(レボホリナート開始後1時間)	day1・15・29 day1・8・15・22・29・36 day1・8・15・22・29・36	56日(8週)	PDまで
大腸がん	145	C-mab+m-FOLFOX6	アービタックス レボホリナート オキサリプラチン 5 FU 5 FU	400(初回のみ)→250 200 85 400 2400	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	2時間→1時間 2時間 2時間 10分 46時間(インフューザ「ボ」ンブ)	day1・8 day1 day1 day1 day1	14日	PDまで
大腸がん	146	bi-w C-mab+m-FOLFOX6	アービタックス レボホリナート オキサリプラチン 5 FU 5 FU	500 200 85 400 2400	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	2時間 2時間 2時間 10分 46時間(インフューザ「ボ」ンブ)	day1 day1 day1 day1 day1	14日	PDまで
大腸がん		C-mab+FOLFIRI	アービタックス レボホリナート カンプト 5 FU 5 FU	400(初回のみ)→250 200 150 400 2400	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	2時間→1時間 2時間 90分 10分 46時間(インフューザ「ボ」ンブ)	day1・8 day1 day1 day1 day1	14日	PDまで

大腸がん	164	P-mab+FOLFIRI	ベクティビックス レボホリナート カンプト 5 FU 5 FU	6 200 150 400 2400	mg/kg mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	60分 2時間 90分 10分 46時間(インフューザ・ポンプ)	day1 day1 day1 day1 day1	14日	PDまで
大腸がん	247	P-mab+IRIS	ベクティビックス カンプト エスワン	6 100 80~120	mg/kg mg/m <sup>2</sup> mg/body	60分 90分 1日2回朝夕食後内服	day1・15 day1・15 day1夕食後~day15朝食後	28日	PDまで
大腸がん	163	P-mab+CPT-11	ベクティビックス カンプト	6 150	mg/kg mg/m <sup>2</sup>	60分 90分	day1 day1	14日	PDまで
大腸がん	87	P-mab (単剤)	ベクティビックス	6	mg/kg	60分	day1	14日	PDまで
大腸がん	135	FOLFOXIRI	カンプト レボホリナート オキサリプラチン 5 FU	165 200 85 3000	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	90分 2時間 2時間 46時間 (インフューザ・ポンプ)	day1 day1 day1 day1	14日	PDまで
大腸がん	51	CPT-11 (100)	カンプト	100	mg/m <sup>2</sup>	90分	day1・8・15	28日	PDまで
大腸がん	52	CPT-11 (150)	カンプト	150	mg/m <sup>2</sup>	90分	day1	14日	PDまで 2コース施行後3週休薬
大腸がん	37	C-mab + CPT-11	アービタックス カンプト	400(初回のみ)→250 150	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	2時間→1時間 90分	day1・8・15・22・29・36・43 day1・15・29	49日 (7週)	PDまで
大腸がん	95	bi-w C-mab+CPT-11	アービタックス カンプト	500 125	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	2時間 90分	day1 day1	14日	PDまで
大腸がん	165	C-mab (単剤)	アービタックス	400(初回のみ)→250	mg/m <sup>2</sup>	2時間→1時間	day1	7日	PDまで
大腸がん	58	UFT/UZL	ユーエフティー ユーゼル	300 75	mg/m <sup>2</sup> mg/body	1日3回内服 (食前後1時間を避け、約8時間ごと)	day1~28	35日	術後補助は5コース 進行再発はPDまで
大腸がん	220	BEV+UFT/UZL	アバスチン ユーエフティー ユーゼル	5 300 75	mg/kg mg/m <sup>2</sup> mg/body	90分→60分→30分 1日3回内服 (食前後1時間を避け、約8時間ごと)	day1・15 day1~21	28日	PDまで
大腸がん	167	BEV+XELODA	アバスチン カベシタピン	7.5 2000	mg/kg mg/m <sup>2</sup>	90分→60分→30分 1日2回朝夕食後内服	day1 day1夕食後~day15朝食後	21日	PDまで
大腸がん	156	BEV+S-1	アバスチン エスワン	7.5 80~120	mg/kg mg/body	90分→60分→30分 1日2回朝夕食後内服	day1 day1夕食後~day15朝食後	21日	PDまで
大腸がん	216	BEV+TAS102	アバスチン ロンサーフ	5 70	mg/kg mg/m <sup>2</sup>	90分→60分→30分 1日2回朝夕食後内服	day1・15 day1~5、day8~12	28日	PDまで
大腸がん	189	BEV+CPT-11	アバスチン カンプト	5 150	mg/kg mg/m <sup>2</sup>	90分→60分→30分 90分	day1	14日	PDまで
大腸がん	65	ゼローダ (B法)	カベシタピン	2500	mg/m <sup>2</sup>	1日2回朝夕食後内服	day1~14	21日	