

がん腫	登録No.	レジメン名	薬品名	1日投与量	単位	投与時間	投与日	投与サイクル	コメント
膵臓がん	26	GEM	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	30分	day1・8・15	28日	術後補助は6コース 進行再発はPDまで
膵臓がん	40	S-1	エスワン	80～120	mg/body	1日2回朝夕食後内服	day1～28	42日	術後補助は4コース 進行再発はPDまで
膵臓がん	136	FOLFIRINOX	オキサリプラチン イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	85 180 200 400 2400	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ²	2時間 90分 2時間 10分 46時間（インフューザーポンプ）	day1 day1 day1 day1 day1	14日	PDまで
膵臓がん	155	GEM+nab-PTX	ゲムシタビン アブラキサン	1000 125	mg/m ² mg/m ²	30分 30分	day1・8・15 day1・8・15	28日	PDまで
膵臓がん	261	オニバイド	オニバイド レボホリナート フルオロウラシル	70 200 2400	mg/m ² mg/m ² mg/m ²	90分 2時間 46時間（インフューザーポンプ）	day1 day1 day1	14日	PDまで
膵臓がん	264	modify FOLFIRINOX	オキサリプラチン イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル	85 150 200 2400	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ²	2時間 90分 2時間 46時間（インフューザーポンプ）	day1 day1 day1 day1	14日	PDまで
胆管がん	25	GEM	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	30分	day1・8・15	28日	PDまで
胆管がん	41	S-1	エスワン	80～120	mg/body	1日2回朝夕食後内服	day1～28	42日	PDまで
胆管がん	99	S-1+GEM	ゲムシタビン エスワン	1000 60～100	mg/m ² mg/body	30分 1日2回朝夕食後内服	day1・8 day1夕食後～day15朝食後	21日	PDまで
胆管がん	100	GC（GEM+CDDP）	ゲムシタビン シスプラチン	1000 25	mg/m ² mg/m ²	30分 60分	day1・8 day1・8	21日	PDまで
胆管がん	278	GCS（GEM+CDDP+S-1）	ゲムシタビン シスプラチン エスワン	1000 25 80～120	mg/m ² mg/m ² mg/body	30分 60分 1日2回朝夕食後内服	day1 day1 day1～7	14日	PDまで
胆管がん	288	イミフィンジ+GC	イミフィンジ シスプラチン ゲムシタビン	1500 25 1000	mg/body mg/m ² mg/m ²	60分 60分 30分	day1 day1・8 day1・8	21日	9コース目からはイミフィンジのみ PDまで
肝臓がん	263	サイラムザ（肝臓）	サイラムザ	8	mg/kg	60分	day1	14日	PDまで
肝臓がん	297	イミフィンジ+イジユド	イジユド イミフィンジ	300 1500	mg/body mg/body	60分 60分	day1	28日	1コース目のみ併用、以後イミフィンジのみ PDまで
肝臓がん	268	テセントリク+アバスチン	テセントリク アバスチン	1200 15	mg/body mg/kg	60分→30分 90分→60分→30分	day1 day1	21日	PDまで

肝臓がん		レンパチニブ(60kg以上)	レンビマ	12	mg/body	1日1回内服	連日		PDまで
肝臓がん		レンパチニブ(60kg以下)	レンビマ	8	mg/body	1日1回内服	連日		PDまで
肝臓がん		レゴラフェニブ	スチバーガ	160	mg/body	1日1回食後内服	day1~21	28日	PDまで